

Esami su Urine 24 ore **acidificate**:

- Catecolamine urinarie (CAT)
- Acido 5-OH-indolacetico (HIAA) (* DIETA)
- Metanefrine (METU)
- Normetanefrine (NMETU)
- Acido omovanillico (OVA)
- Serotonina urinaria (SERO) (* DIETA)
- Acido vanilmandelico (VMA) (* DIETA)
- Adrenalina urinaria (ADRU)
- Noradrenalina urinaria (NORU)

Presentarsi in accettazione a ritirare il materiale necessario prima di iniziare la raccolta.

Materiale fornito:

- Guanti (Dispositivo di Protezione Individuale di I categoria con protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche)
- Provetta di acido cloridrico (HCl 10 N) 10 ml (da conservare in luogo fresco e al buio)
- Contenitore per aliquota, da consegnare in ambulatorio

Materiale necessario non fornito:

- Contenitore per la raccolta delle urine 24 ore

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA

- Al mattino svuotare la vescica, eliminare le urine e annotare l'ora.
- Versare nel contenitore per la raccolta delle urine 24 ore la successiva minzione; dopodiché, indossare i guanti protettivi e vuotarvi la provetta di acido cloridrico.
ATTENZIONE: non creare schizzi; non inalare eventuali vapori.
- Raccogliere le urine delle successive 24 ore, fino alla prima del mattino successivo (compresa) in un contenitore separato e versarle di volta in volta nel contenitore per le urine 24 ore, facendo sempre attenzione a non provocare schizzi.
Al termine misurare la diuresi totale.
- Mescolare l'intera raccolta e versarne un'aliquota nel contenitore fornito. Consegnare l'aliquota in ambulatorio comunicando la diuresi totale.
Portare la provetta vuota di acido cloridrico (per lo smaltimento).

* DIETA: Per questi esami, a partire da 48 ore prima dell'inizio della raccolta e per tutta la durata della raccolta stessa, è necessario seguire una **dieta priva dei seguenti alimenti**: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante tale periodo si consiglia inoltre, previa consultazione del medico curante, di evitare l'assunzione di farmaci; qualora ciò non sia possibile, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame.

ATTENZIONE: ACIDO CLORIDRICO PROVOCA USTIONI IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE

Se inalato: Trasportare la persona all'aria fresca, lontano dalla fonte pericolosa. In casi gravi di arresto della respirazione, procedere con la respirazione artificiale. **Consultare un medico.**

In caso di contatto con la pelle: Lavare bene con sapone e abbondante quantità d'acqua. Togliere immediatamente scarpe e indumenti contaminati (lavarli prima di usarli di nuovo). **Consultare un medico.**

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. **Consultare un medico.**

Se ingerito: NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare alcunché a persone prive di sensi. **Consultare un medico.**

